




**YaraVita™**

**Stopit™**



**10 Litres/  
Liter**

**Masse nette/  
Nettogewicht  
13,27 kg**

#### AVIS

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce qui figure sur l'ensemble de l'étiquette

Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

#### HINWEIS

Vor Einsatz des Produkts ist das ganze Etikett zu lesen

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich

# Stopit™

**ENGRAIS CE**

**Solution de chlorure de calcium**

Analyse garantie:

**16,9% = 224 g/l oxyde de calcium (CaO) soluble dans l'eau**

Ce produit risque, s'il n'est pas utilisé de manière appropriée, de porter atteinte à la fertilité du sol, à l'état des eaux et à l'air et de nuire à la qualité des plantes. Il ne doit pas être appliqué ni dans les zones protégées selon le droit fédéral ou cantonal concernant la protection de la nature, ni dans les roselières et les marais hors des zones protégées, ni dans les haies, les bosquets, les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de ces trois éléments-ci, ainsi que dans la zone S1 (zone de captage) des zones de protection des eaux souterraines.

Fabriqué par/Hergestellt durch Yara UK Ltd, Pocklington, York YO42 1DN, UK

Distribué par/Exklusiv-Importeur: fenaco Genossenschaft,  
**LANDOR**, CH-4127 Birsfelden



**NOCIF/ REIZSTOFF**

Contient du chlorure de calcium Irritant pour les yeux Evite le contact avec la peau Ne pas respirer les aerosols

Enthält Calciumchlorid Reizt die Augen Kontakt mit der Haut vermeiden Beim Spritzen nicht einatmen

# Stopit

## DOSES ET STADES D'APPLICATION

**Abricotier, Cerisier, Pruniers:** 2 applications de 10 l/ha dans 500 l d'eau minimum à 10-15 jours d'intervalle. Faire la première application 4 semaines avant la cueillette.

**Fraisiers (De Plein Champ):** 3 applications de 10 litres/ha dans 500 litres d'eau minimum à 8-15 jours d'intervalle. Commencer les applications à partir du stade début floraison. Sur variétés remontantes, diviser la dose totale de 30 litres en 6 applications de 5 litres à 10-15 jours d'intervalle.

**Poirier:** 6 à 10 l/ha dans 500 l d'eau minimum. Répéter l'application 2 à 3 fois à 8 à 15 jours d'intervalle, selon la gravité du problème.

Commencer les applications à tout moment après la chute des pétales afin que le dernier traitement soit effectué une semaine avant la cueillette.

**Pommes De Terre:** 2 ou 3 applications de 5-10 l/ha dans 200 litres d'eau à 10-15 jours d'intervalle. Commencer les applications à l'initiation des tubercules (50% des stolons gonflés à leurs pointes à deux fois le diamètre normal).

**Pommier:** 6 à 10 l/ha dans 500 l d'eau minimum. Répéter l'application 5 à 8 fois à 8 à 15 jours d'intervalle, selon la gravité du problème.

Commencer les applications à tout moment après la chute des pétales afin que le dernier traitement soit effectué une semaine avant la cueillette.

N.B.: Les applications tardives sont particulièrement efficaces sur la variété 'Granny Smith'.

## MODE D'EMPLOI

### SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT SUR L'ETIQUETTE

*Secouer le bidon et verser le produit à travers un filtre dans la cuve remplie aux trois-quarts d'eau.* L'agitateur doit être en fonctionnement pendant cette opération. Finir de remplir la cuve et procéder à la pulvérisation. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

## MÉLANGE EN CUVE/CO-APPLICATION

Lire attentivement toutes les étiquettes et se conformer au mode d'emploi ainsi qu'aux recommandations suivant les produits devant être co-appliqués etc. Certains paramètres peuvent varier en fonction de Yara, peuvent avoir des instructions sur les performances des produits co-appliqués. Par conséquent, la co-application est réalisée aux risques et périls de l'utilisateur final. Il est fortement recommandé d'effectuer tout d'abord une application limitée en cas d'utilisation de mélanges de produits inhébributels. Avant la co-application de produits, consultez le site [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) afin d'obtenir des informations. Vous avez également la possibilité de contacter Yara pour obtenir des conseils.

## PRÉCAUTIONS

Produit devant être utilisé uniquement sur des cultures figurant sur la liste. Evitez l'application dans des conditions climatiques extrêmes, par exemple en cas de sécheresse, d'humidité importante, de gel, de pluie, lorsque ces conditions sont attendues. Portez des gants ainsi qu'un écran facial lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyez tous les équipements avant et après utilisation.

## STOCKAGE

A conserver dans un endroit frais et sec, en dehors de la portée des enfants ou des animaux. A protéger contre le gel et autres températures extrêmes (températures supérieures à 40 °C).

## CONDITIONS DE VENTE – GARANTIE LIMITÉE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Yara garantit le fait que le produit, dans son conteneur fermé, est conforme à la description figurant sur cette étiquette. Les instructions figurant sur cette étiquette doivent être suivies à la lettre. Elles se basent sur des tests et représentent des données fiables. Les conditions climatiques, l'état du sol et les conditions d'utilisation de ce produit se trouvent en dehors du contrôle de Yara. Par conséquent, il n'existe aucune garantie, expresse ou implicite, sur les effets de l'utilisation de ce produit ou sur les résultats obtenus. En aucun cas la responsabilité de Yara ne peut être estimée à une somme supérieure au prix du produit utilisé. L'acheteur doit assumer les risques liés au stockage, à l'utilisation et à l'application de ce produit. Les marchandises sont vendues sous réserve des conditions de vente de Yara. Celles-ci sont disponibles sur demande. L'utilisation des produits implique que l'acheteur accepte ces conditions de vente.

# Stopit

## ANWENDUNGSMENGEN UND -ZEITEN

**Aprikose, Kirsche, Pflaume:** 2 Behandlungen mit 10 l/ha in mindestens 500 l Wasser in Abständen von 10-15 Tagen. Erste Behandlung 4 Wochen vor der Ernte.

**Erdbeeren (Feldpflanzung):** 3 Behandlungen mit 10 Liter/ha in mindestens 500 Liter Wasser in Abständen von 8-15 Tagen. Mit der Behandlung ab dem Blütebeginn anfangen. Bei remontanten Sorten die Gesamtdosis von 30 Litern über 6 Anwendungen von je 5 Litern aufteilen.

**Brüne:** 6 bis 10 l/ha in mindestens 500 l Wasser. Je nach Schwere des Problems Behandlung 2 bis 3 mal in Abständen von 8 bis 15 Tagen wiederholen. Mit der Behandlung jederzeit nach dem Abfallen der Blütenblätter beginnen, so dass die letzte Anwendung eine Woche vor der Ernte erfolgt.

**Kartoffeln:** 2 oder 3 Behandlungen mit 5-10 l/ha in 200 Liter Wasser in Abständen von 10-15 Tagen. Mit den Anwendungen bei Beginn der Knollennbildung (50% der geschwollenen Ausläufer, wenn sie das Zweifache des normalen Durchmessers erreicht haben) beginnen.

**Apfel:** 6 bis 10 l/ha in mindestens 500 l Wasser. Je nach Schwere des Problems Behandlung 5 bis 8 mal in Abständen von 8 bis 15 Tagen wiederholen. Mit der Behandlung jederzeit nach dem Abfallen der Blütenblätter beginnen, so dass die letzte Anwendung eine Woche vor der Ernte erfolgt. N.B.: Spätere Anwendungen sind vor allem bei der Sorte 'Granny Smith' besonders wirksam.

## GEBRÄUCHSANWEISUNG

Verwendung ausschließlich auf diesem Etikett ist stets folge zu LEISTEN

Ver Gebrauch gründlich schützen! Sicherstellen, dass die Spritze und anderes Zubehör gründlich gereinigt wurden. Die Spritze dreiviertel mit Wasser befüllen, Rührwerk einschalten und das Produkt durch den Filter oder Einstellschlauch einfüllen. Tank mit Wasser auffüllen; während der gesamten Spritzdauer röhren. Nach Beendigung des Spritzvorganges Spritze vollständig entleeren. Nach Gebrauch Spritze gründlich reinigen.

## TANKMISCHEN/GEMEINSAME ANWENDUNG

Allgemeine Etiketten sorgfältig lesen und Gebrauchsanweisung genauestens einhalten, vor allem auch in Bezug darauf, ob die Produkte gemeinsam angewendet werden können. Gewisse Variablen, die von Yara nicht beeinflusst werden können, können sich auf das Verhalten gemeinsam angewandter Produkte auswirken, weshalb eine gemeinsame Anwendung ausdrücklich unter Bezug des Herstellergrundsatzes gewünscht wird und empfohlen. Die Verwendung unterschiedlicher Produktschutzanlagen erfordert eine beschränkte Anwendung durchzuführen. Vor einer gemeinsamen Anwendung der Produkte müssen Sie oder Ihr Berater unter [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) wichtige Informationen einholen. Andernfalls können Sie sich auch bei Yara spezifisch beraten lassen.

## VORSICHTSMAHNAHMEN

Für Kulturen unter Glas oder Folie nicht verwenden sowie nicht ausdrücklich empfohlen. Anwendung unter extremen Witterungsbedingungen, wie bei zu raschem oder extrem langsamem Trocknen, Frost, Regen oder bei bevorstehendem Frost oder Regen vermeiden. Zur Handhabung des Produkts entsprechende Handschuhe und eine Gesichtsmaske tragen. Alte Ausrüstungen vor und nach dem Gebrauch reinigen.

## LAGERUNG

An einem kühlen trockenen Ort, für Kinder und Tiere unerreichbar lagern. Gegen Frost und andere extreme Wetterbedingungen schützen.

## VERKAUFSBEDINGUNGEN – BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Yara gewährleistet, dass das Produkt im ungeöffneten Behälter der chemischen Beschreibung auf diesem Etikett entspricht. Die Anweisungen auf diesem Etikett, die auf unseres Erachtens zuverlässigen Tests beruhen, sind sorgfältig einzuhalten. Da das Auftreten ungewöhnlicher Witterungs- oder Bodenbedingungen sowie die Verwendung dieses Produkts von Yara nicht beeinflusst werden können, wird in Bezug auf die Auswirkungen eines derartigen Gebrauchs oder die damit erzielten Ergebnisse keine Garantie, weder ausdrücklicher noch stillschweigender Natur, abgegeben und die Haftung für Schäden, die durch die Verwendung dieses Produkts übersteigen. Der Käufer übernimmt sämtliche Risiken von Lagerung, Gebrauch oder Anwendung dieses Produkts. Der Verkauf der Waren erfolgt gemäß den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Yara, die auf Anfrage erhältlich sind. Mit dem Gebrauch des Produkts erklärt sich der Käufer mit diesen Verkaufsbedingungen einverstanden.