

# Fruits à noyau

| Stade de développement                                                        | Produits                                                                                                | kg/ha   | Remarques                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bourgeon d'hiver<br>(BBCH 00–01)                                              | <b>Spécial</b><br>6.8.24 + 2 Mg + 15 S + 0.1 B                                                          | 200–400 | Engrais complets exempts de chlore avec potasse et magnésium sous formes sulfates                                                  |
|                                                                               | <b>Hasolit Kombi</b><br>64 CaCO <sub>3</sub>                                                            | 200–300 | Engrais riche en magnésium et en chaux. Compléter l'apport d'azote avec, par exemple, du Nitrate magnésien soufré 24 + 5 Mg + 6 S  |
| Gonflements des bourgeons<br>(BBCH 01–03)                                     | <b>Terbona</b><br>15.5.20 + 1.2 Mg + 8 S + 0.02 B                                                       | 200–500 |                                                                                                                                    |
|                                                                               | <b>Hasorgan Profi</b>  | 2 × 31  |                                                                                                                                    |
| Gonflement des bourgeons à l'éclatement des bourgeons floraux<br>(BBCH 03–53) | <b>Sulfonitrate + B + S</b><br>26 N + 14 S + 0.2 B                                                      | 100–200 | Engrais azoté à action prolongée avec bore et soufre. Contient l'azote sous forme de nitrate et d'ammonium (⅓ nitrate, ⅔ ammonium) |
|                                                                               | <b>Nitrate magnésien soufré</b><br>24 N + 5 Mg + 6 S                                                    | 100–200 |                                                                                                                                    |
| De l'éclatement des bourgeons à la fin de la floraison<br>(BBCH 53–69)        | <b>Borstar</b>         | 21      |                                                                                                                                    |
| Formation des boutons floraux jusqu'à peu après la floraison<br>(BBCH 55–69)  | <b>Nitrate de chaux boriqué</b><br>15.5 N + 0.3 B                                                       | 100–200 |                                                                                                                                    |

Vous trouverez des recommandations détaillées concernant les engrais foliaires dans la brochure Fruits à noyau.

## Besoins en unités fertilisantes par ha

sans prise en compte des résidus de récoltes, des rendements attendus et des analyses de sol

| Cultures   | Rendement dt/ha | N  | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | Mg |
|------------|-----------------|----|-------------------------------|------------------|----|
| Abricotier | 200             | 60 | 25                            | 75               | 20 |
| Prunier    | 150             | 60 | 15                            | 50               | 15 |
| Cerisier   | 160             | 80 | 30                            | 65               | 30 |

Source : PRIF 2017, révisée

