

# Sufrostar

Düngertyp Nr.: 445, Schwefelsuspension / pH 5.5

Type d'engrais No 445, suspension de soufre / pH 5.5

## **Inhaltsstoffe:**

57% Schwefel (S) elementar (800 g/l)

## **Composition:**

57% soufre (S) élémentaire (800 g/l)

## **Vor Gebrauch gut schütteln**

Ausbringung gemäss Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau der Agroscope (GRUD)  
Trocken und in verschlossenem Gebinde aufbewahren. Von Futter- und Nahrungsmitteln fernhalten. Restmengen der bestimmungsgemässen Verwendung zuführen oder im Sonderabfall entsorgen. Leere Packungen können mit dem Hauskehricht entsorgt werden.

## **Bien agiter avant utilisation**

*Épandage conformément aux principes de la fertilisation des cultures agricoles en Suisse d'Agroscope (PRIF)  
Entreposer au sec dans des emballages fermés. Tenir à l'écart des aliments pour animaux et aliments. Utiliser les quantités restantes à l'usage prévu ou éliminer dans une déchetterie dans les produits spéciaux. Les emballages vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.*

**LANDOR** fenaco Genossenschaft

Erlachstrasse 5, 3012 Bern

058 433 66 66, info@landor.ch



# 10l

Netto/  
net 14.3kg



7 640122 011411

## Anwendung / Utilisation

Kultur/ Cultures	Dosis/ Recommendations	Zeitpunkt/ Application
Wintergetreide <i>Céréales</i>	3 – 5l/ha	Herbst: ab 4-Blatt-Stadium. Frühling: ab Vegetationsbeginn <i>Automne: à partir du stade 4 feuilles. Printemps: dès le début de la végétation</i>
Raps <i>Colza</i>	3 – 5l/ha	Herbst: ab 4-Blatt-Stadium. Frühling: bei Bedarf <i>Automne: à partir du stade 4 feuilles. Printemps: si nécessaire</i>
Obstbau <i>Arboriculture</i>	2 – 3l/ha	Kernobst: ab Stadium rote Knospe, Steinobst: ab Fruchtansatz <i>Fruits à noyau: dès le stade jeunes fruits. Fruits à pépins: dès le stade bouton rouge</i>
Reben <i>Vigne</i>	3l/ha	Ab Vergrössern der Gescheine <i>Dès le stade inflorescences visibles</i>

Empfohlene Wassermenge: 200–1000l/ha. Die Applikation wird abends, morgens oder an bewölkten Tagen empfohlen.  
*Quantité d'eau recommandée: 200–1000l/ha. L'application est recommandée le soir, le matin ou par temps nuageux.*

## Mischbarkeit

Mit gängigen Pflanzenschutzmitteln mischbar. Vor dem Ausbringen eine Mischprobe durchführen. Bei erstmaliger Anwendung empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

- 1) Füllen Sie den Spritztank zur Hälfte mit Wasser.
- 2) Schalten Sie den Rührer ein.
- 3) Geben Sie die empfohlene Menge Sufrostar hinzu.
- 4) Optional: Fügen Sie ein Pflanzenschutzmittel hinzu.
- 5) Füllen Sie die Flüssigkeit bis zur gewünschten Menge auf.
- 6) Die Mischung sollte direkt nach der Vorbereitung ausgebracht werden.

## Achtung

Verursacht Hautreizungen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/  
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel  
Wasser und Seife waschen.

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/  
ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemässen Entsorgung  
nach lokalen/nationalen Bestimmungen zuführen.

## Miscibilité

Miscible avec les produits phytosanitaires usuels. Effectuer un test de mélange avant le traitement. Lors de la première utilisation, nous recommandons la procédure suivante:

- 1) Remplissez la cuve du pulvérisateur à moitié avec de l'eau.
- 2) Mettez l'agitateur en marche.
- 3) Ajoutez la quantité recommandée de Sufrostar.
- 4) En option: ajoutez un produit phytosanitaire.
- 5) Complétez le liquide jusqu'à la quantité souhaitée.
- 6) Le mélange doit être appliqué immédiatement après la préparation.

## Attention

Provoque une irritation cutanée.

Porter des gants de protection/des vêtements de  
protection/un équipement de protection des  
yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver  
abondamment à l'eau et au savon.

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.  
Éliminer le contenu/récipient conformément à la  
réglementation locale/nationale.

