

Nitrostar

Netto / net
20 L

Gewicht / Masse nette
25.5 kg

pH
10

Vertrieben durch / Distribué par
LANDOR fenaco Genossenschaft
Erlachstrasse 5, 3012 Bern
058 433 66 66, info@landor.ch



7 640122 012081



Flüssiger anorganischer Einnährstoff-Makronährstoff-Dünger *Engrais inorganique liquide simple à macroélément*

28 % N (357g N/L) Gesamtstickstoff / *Azote totale*

8 % CH₄N₂O Harnstoffstickstoff / *Azote uréique*

20 % N Stickstoff aus Formaldehydharnstoff / *Azote issu d'urée-formaldéhyde*

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Inhaltsstoffe

Methylenharnstoff CAS: 9011-05-6 (CMC 8)

Harnstoff CAS: 57-13-6 (CMC 1)

CMC 8: Nährstoff-Polymere / CMC 1: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen

Lagerung

Kühl, trocken und in verschlossenem Gebinde aufbewahren. Vor Frost schützen. Von Futter- und Nahrungsmitteln fernhalten. Restmengen der bestimmungsgemässen Verwendung zuführen oder im Sonderabfall entsorgen. Leere Packungen können mit dem Hauskehricht entsorgt werden.

Dosierung und Anwendung

Blatt-Anwendung

• Kartoffeln

Dosierung: 10 l/ha pro Applikation. Anwendung ab Reihenschluss.

• Mais

Dosierung: 10 l/ha pro Applikation. Anwendung im 4- bis 8-Blatt-Stadium der Kultur.

• Zuckerrüben

Dosierung: 10 l/ha pro Applikation. Anwendung ab Reihenschluss.

• Gemüsebau allgemein

Dosierung: 10 l/ha pro Applikation. Anwendung nach Bedarf. Letzte Applikation 4 Wochen vor der Ernte.

• Getreide

Dosierung: 10 l/ha pro Applikation. Anwendung zur Bestockung oder im Fahrenblattstadium bis zur Blüte.

Anwendungsempfehlung

Nitrostar kann einmal oder mehrmals pro Kultur angewendet werden. Bei mehreren Applikationen eine Pause von 2-3 Wochen einhalten. Nitrostar ist mit den meisten Pflanzenschutzmitteln mischbar. Im Zweifelsfalle wird geraten, eine Mischprobe durchzuführen oder Beratung anzufordern. Nicht mit Spritzbrühen unter pH 5 mischen.

POUR UN USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Ingrédients

Méthylène-Urée CAS: 9011-05-6 (CMC 8)

Urée CAS: 57-13-6 (CMC 1)

CMC 8: Polymères nutritifs / CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges

Stockage

Entreposer au sec, frais et dans des emballages fermés. A protéger contre le gel. Tenir à l'écart des aliments pour animaux et aliments. Utiliser les quantités restantes à l'usage prévu ou éliminer dans une déchetterie dans les produits spéciaux. Les emballages vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.

Doses et mode d'emploi

Application foliaire

• Pommes de terre

Dosage: 10 l/ha par application. Application dès la fermeture des rangs.

• Mais

Dosage: 10 l/ha par application. Application au stade 4 à 8 feuilles de la culture.

• Betteraves à sucre

Dosage: 10 l/ha par application. Application dès la fermeture des rangs.

• Cultures maraîchères en général

Dosage: 10 l/ha par application. Application selon les besoins. Dernière application 4 semaines avant la récolte.

• Céréales

Dosage: 10 l/ha par application. Application au tallage ou au stade de la dernière feuille étalée jusqu'à la floraison.

Conseil pratiques d'utilisation

Nitrostar peut être appliqué une ou plusieurs fois par culture. En cas d'applications multiples, respecter un intervalle de 2 à 3 semaines. Nitrostar est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires. En cas de doute, il est recommandé de réaliser un test de compatibilité ou de demander un conseil. Ne pas mélanger avec des bouillies phytosanitaires en dessous de pH 5.



ACHTUNG

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

UFI: QCQR-0JQW-K216-YX2M

ATTENTION

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

