

LANDOR

(bio)



7 640122 011527

10
Liter/
Litres

Fertiplus Bio

PFC 1(A)(II) Flüssiger organischer NPK-Dünger
PFC 1(A)(II) Engrais organique liquide complet

3.1% (40 g/l) N Stickstoff/Azote
 1.9% (24 g/l) P₂O₅ Phosphat/Phosphate
 5.4% (70 g/l) K₂O Kali/Potasse
 25–40% OS/MO
 6% Aminosäuren/Acides Aminés

Ausgangsstoffe

Vinasse *1. CMC 1- CAS Nr. --
 Wasser *1. CMC 1- CAS Nr. 7732-18-5
 Fischknochenmehl *10. CMC 10- CAS Nr. --
 *1. Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen
 *10. Folgeprodukte aus tierischen Nebenprodukten

Blattanwendung

Produkt vor Gebrauch gut homogenisieren.

Dosis: 5 l/ha; maximale Konzentration: 5 % (5 l auf 100 l Wasser).

Getreide: vom Schossen bis zum Ährenschwellen; vom Erscheinen des letzten Blattes bis zum Beginn des Ährenschiebens.

Leguminosen, Erbsen: Beginn Blüte – flache Hülsen

Kartoffeln: von Beginn der Knollenbildung alle 14 Tage

Mais, Raps, Rüben: ab schwierigen Bedingungen oder ab Vegetationsbeginn

Gemüse: 3 bis 4 Anwendungen alle 15 Tage ab Vegetationsbeginn

Reben: zu Beginn Blüte – Ende des Traubenschlusses, dann alle 10–14 Tage nach Bedarf

Obst: 4 Anwendungen ab abgehender Blüte, dann alle 14 Tage

Ber Kultur in geschütztem Anbau einen Vorversuch mit einer Konzentration von 2.5 % durchführen um das Verhalten der Vegetation zu beobachten.

Nutztiere dürfen weder direkt noch durch Beweidung mit Grünfütter von Flächen gefüttert werden, auf denen das Produkt angewendet wurde, es sei denn, der Schnitt oder die Beweidung erfolgt nach einer Wartezeit von mindestens 21 Tagen.

Darf nicht direkt auf essbare Pflanzenteile angewendet werden.

Lagerung

Kühl, trocken und in verschlossenem Gebinde aufbewahren. Vor Frost schützen. Von Futter- und Nahrungsmitteln fernhalten. Restmengen der bestimmungsgemässen Verwendung zuführen oder im Sonderabfall entsorgen. Leere Packungen können mit dem Hauskehricht entsorgt werden.

Hergestellt durch / Fabriqué par:

Agronutrition, F - 31390 Carbonne

LANDOR, fenaco Genossenschaft

Erlachstrasse 5, 3012 Bern

058 433 66 66, info@landor.ch

Matière première

Vinasse *1. CMC1- CAS Nr. --
 Eau *1. CMC1- CAS Nr. 7732-18-5
 Farine d'os de poisson *10. CMC10- CAS Nr. --
 *1 Substances et mélanges à base de matières vierges
 *10 Produits dérivés provenant de sous-produits animaux

Application foliaire

Bien homogénéiser le produit avant emploi.

Dose: 5 l/ha; concentration maximale: 5 % (5 l pour 100 l d'eau)

Céréales: de la montaison au gonflement; de sortie dernière feuille à début épiaison

Oleo-proteagineux: 5–10 cm – début floraison – gousses plates

Pomme de terre: 3–4 applications de début tubérisation puis tous les 15 jours

Maïs, colza, betteraves: En conditions difficiles ou dès le démarrage

Cultures légumières: 3 à 4 applications tous les 15 jours dès le démarrage végétatif

Vigne: Grappes séparées – début floraison – nouaison puis tous les 15 jours

Arbres fruitiers, agrumes, pépinières: 4 applications dès chute des pétales puis tous les 15 jours

Pour les **cultures sous abri**, procéder à un test préalable à la concentration de 2,5 % pour observer le comportement de la végétation.

Ne pas nourrir les animaux d'élevage, directement ou par pâturage, avec des herbages provenant de sols sur lesquels le produit a été appliqué, sauf si la coupe ou le pâturage ont lieu après l'expiration d'une période d'attente d'au moins 21 jours.

Ne doit pas être utilisé directement sur les parties comestibles des plantes.

Stockage

Entreposer au sec, frais et dans des emballages fermés. A protéger contre le gel. Tenir à l'écart des aliments pour animaux et aliments. Utiliser les quantités restantes à l'usage prévu ou éliminer dans une déchetterie dans les produits spéciaux. Les emballages vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.

Netto/net

12.9 kg

Dichte/densité

1.29 kg/l