EMANUELLE

Stand 01.11.2024

Die Sortenbeurteilung und die Anbauempfehlungen beruhen auf dem aktuellen Stand der Erkenntnisse

Sortenbeschreibung		Anfälligkeit	
Verwendung:	Speisesorte festkochend	Krautfäule/Knollenfäule:	gering/gering-mittel
Züchter:	HZPC	Rhizoctonia Pocken/Deformation:	mittel/hoch
Reife:	mittelfrüh	Schorf:	gering
Kochtyp:	B-A	Pulverschorf:	gering
Knollen pro Staude:	7-11	Virus Blattroll PLRV:	gering
Knollenertrag:	hoch	Virus Mosaik PVY:	hoch
Stärkegehalt:	10-15 %	Alternaria:	gering-mittel
Lagereignung:	gut	Schlagschäden:	gering
Keimruhe:	mittel	Empfindlichkeit auf Abkeimen:	mittel-hoch
Kraut bei der Vernichtung:	laubschwach	Metribuzin Empfindlichkeit:	NA max. 350 g Wirkstoff

Sortenspezifische Anbauinformationen

Pflanzgutaufbereitung-Vorkeimung

Wärmeschock bis Keime sichtbar.

Kaliber in mm	Pflanzabstand in cm	Pflanzdichte pro ha in Stück
30-35	19-23	71 200-58 000
35-45	23-25	58 000-53 300
www.agroline.ch/pflanzkartoffel-bedarfsrechner		

Pflanzenschutz

Knollen Beizung: Lagerbeizung.

Alternaria:

Blattläuse: ÖLN Schadschwelle: Pro Fiederblatt 10 Blattläuse (Movento/Teppeki).

Krautvernichtung

1. Massnahme	Spotlight Plus 1 l/ha oder Firebird Plus 2 l/ha
2. Massnahme	evtl. nach 5-8 Tagen: Spotlight Plus 1 l/ha oder Firebird Plus 2 l/ha
ohne Pflanzenschutzmittel	Schlegeln und Abflammen

Düngung **(Nährstoffversorgung bei Bodenversorgungsklasse C)**

Nährstoffe	Optimum kg/ha	Bemerkungen
Stickstoff	80-100	
Phosphor (wasserlöslich)	80-100	
Kali (chlorfrei)	250-350	
Magnesium	40	
Spurenelemente		Spurenelemente über Blattdünger ergänzen (EPSO Microtop, Fertiplus)

Wichtige Anbauhinweise

anfällig auf oberflächene Fäulnisflecken (Pit Rot), Keimbruch verhindern.