

le descriptif variétal et les conseils techniques sont basés sur les connaissances actuelles.

| Description variétale | | Sensibilité | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Utilisation : | frites | Mildiou (fanés/tubercules) : | moyenne-élevée/ moyenne |
| Obtenteur : | Svalöf Weibull | Rhizoctone (pustules/déformant) : | moyenne/faible |
| Précocité : | mi-précoce-mi-tardive | Gale commune : | faible |
| Type culinaire : | C-D | Gale poudreuse : | moyenne |
| Nbre tubercules par plante : | 10-14 | Virus enrroulement de PLRV : | moyenne |
| Rendement à maturité : | élevé | Virus la mosaïque PVY : | moyenne-élevée |
| Teneur en amidon : | 15-18 % | Alternariose : | moyenne |
| Aptitude à la conservation : | bonne | Chocs : | moyenne |
| Dormance : | moyenne | Sensibilité à l'égermage : | faible |
| Destruction des fanés : | difficile à défaner | Métribuzine : | post-levée, max. 350 g matière active |

Conseils culturaux

Préparation des plants-prégermination

Choc thermique jusqu'à apparition des points blancs.

| Calibres en mm | Distance de plantation en cm | Densité de plantation |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 30-40 | 22-24 | 60 600-55 500 |
| 40-50 | 26-30 | 51 300-44 400 |



www.agroline.ch/Besoin-en-plants-de-pommes-de-terre

Protection des plantes

Traitement des plants : à la plantation.

Alternariose : Pour une lutte conséquente, mélanger avec les anti-mildiou des produits spécifiques tels que : Amistar/Dagonis/Taifen/Difenoconazol (divers)/Flint/Signum.

Pucerons : Seuil PER : 10 pucerons par feuille pennée (vraie feuille). Produits : Movento.

| Défanage | Variante sans déchiquetage | Variante avec déchiquetage |
|-----------------------------|---|--|
| 1 ^{er} traitement | Firebird Plus 2 l/ha | Déchiqueter |
| 2 ^{ème} traitement | Après 5-8 jours : Spotlight Plus 1 l/ha | Après 1-3 jours : Spotlight Plus 1 l/ha ou Firebird Plus 2 l/ha |
| 3 ^{ème} traitement | Ev. après 5-8 jours : Spotlight Plus 1 l/ha | Ev. après 5-8 jours : Spotlight Plus 1 l/ha ou Firebird Plus 2 l/ha |
| Sans produit de défanage | Déchiqueter puis brûler au gaz | |

Fumure conseillée pour sol avec analyse satisfaisante (C)

| Eléments nutritifs | Optimum kg/ha | Remarques |
|-----------------------|---------------|---|
| Azote | 140-160 | Fractionner, appliquer 40 kg d'azote au moment de la tubérisation. |
| Phosphore (soluble) | 80-100 | Patastar Plus améliore la tubérisation |
| Potasse (sans chlore) | 250-350 | |
| Magnésium | 40 | |
| Oligo-éléments | | Compléter les oligo-éléments par des apports foliaires avec : Epsa microtop, MagMan Plus, Sulfomag |

Informations importantes