

le descriptif variétal et les conseils techniques sont basés sur les connaissances actuelles.

| Description variétale        |                            | Sensibilité                       |                |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Utilisation :                | consommation à chair ferme | Mildiou (fanés/tubercules) :      | élevée/moyenne |
| Obtenteur :                  | C.Meijer B.V.              | Rhizoctone (pustules/déformant) : | moyenne/faible |
| Précocité :                  | très précoce               | Gale commune :                    | faible         |
| Type culinaire :             | A-B                        | Gale poudreuse :                  | élevée         |
| Nbre tubercules par plante : | 11-14                      | Virus enroulement de PLRV :       | moyenne        |
| Rendement à maturité :       | moyen-élevé                | Virus la mosaïque PVY :           | faible         |
| Teneur en amidon :           | 11-13 %                    | Alternariose :                    | moyenne-élevée |
| Aptitude à la conservation : | mauvaise                   | Chocs :                           | moyenne        |
| Dormance :                   | faible                     | Sensibilité à l'égermage :        | moyenne        |
| Destruction des fanés :      | facile à défaner           | Métribuzine :                     | pré-levée      |

### Conseils culturaux

#### Préparation des plants-prégermination

Choc thermique jusqu'à apparition des points blancs.

| Calibres en mm | Distance de plantation en cm | Densité de plantation |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 32-35          | 22-24                        | 60 600-55 600         |
| 35-50          | 26-28                        | 51 300-47 600         |



[www.agroline.ch/Besoin-en-plants-de-pommes-de-terre](http://www.agroline.ch/Besoin-en-plants-de-pommes-de-terre)

#### Protection des plantes

**Traitement des plants :** avant stockage

**Alternariose :** Pour une lutte conséquente, mélanger avec les anti-mildiou des produits spécifiques tels que : Amistar/Dagonis/Taifen/Difenoconazol (divers)/Flint/Signum.

**Pucerons :** Seuil PER : 10 pucerons par feuille pennée (vraie feuille). Produits : Movento

#### Défanage

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1 <sup>er</sup> traitement  | Spotlight Plus 1 l/ha ou Firebird Plus 2 l/ha                       |
| 2 <sup>eme</sup> traitement | Ev. après 5-8 jours : Spotlight Plus 1 l/ha ou Firebird Plus 2 l/ha |
| Sans produit de défanage    | Déchiqueter puis brûler au gaz                                      |

#### Fumure conseillée pour sol avec analyse satisfaisante (C)

| Éléments nutritifs    | Optimum kg/ha | Remarques  |
|-----------------------|---------------|--|
| Azote                 | 120-140       |  |
| Phosphore (soluble)   | 80-100        | Patostar Plus améliore la tubérisation.  |
| Potasse (sans chlore) | 250-350       |  |
| Magnésium             | 40            |  |
| Oligo-éléments        |               | Compléter les oligo-éléments par des apports foliaires avec : Epso microtop, MagMan Plus, Sulfomag |

### Informations importantes

Assez sensible aux taches de rouilles, aux coeurs creux.